



Similasan

Similasan BlephaCura®

Gebrauchsanweisung

Similasan BlephaCura® liposomal Suspension zur Linderung von Lidrandentzündungen und zur täglichen Lidrandpflege

Inhaltsstoffe

1 ml enthält: Natriumchlorid 8 mg, Soja-Lecithin 5 mg, Phenoxyethanol 5 mg, Ethanol 4 mg, Vitamin E-Palmitat 0,125 mg, Vitamin E 0,01 mg, Aqua purificata

Anwendungsgebiete

Similasan BlephaCura® dient zur Linderung und begleitenden Behandlung von Lidrandentzündungen sowie zur täglichen Lidrandpflege und -hygiene. Similasan BlephaCura® unterstützt und fördert den natürlichen Heilungsprozess bei Entzündungen und Reizungen der Lidränder.

Anwendung

Es wird empfohlen Similasan BlephaCura® zweimal täglich, jeweils morgens und abends, anzuwenden. Similasan BlephaCura® sollte unter Verwendung von zur Augenlidpflege geeigneten, fusselfreien (Baumwoll-) Wattepads aufgetragen werden. Um Verunreinigungen zu vermeiden, sollte mit dem Tropfeinsatz keine Oberfläche berührt werden, insbesondere nicht das Wattepad. Bitte Similasan BlephaCura® mit kleinem Abstand auf das Wattepad tropfen. Im Rahmen der täglichen Lidrandpflege und -hygiene mit Similasan BlephaCura® sollten alle Krusten und Ablagerungen gründlich entfernt werden. Es wird empfohlen die Anwendung mit zuvor gereinigten Händen durchzuführen.

Tipps für die richtige Anwendung:

- Befreuen Sie ein Wattepad mit Similasan BlephaCura®
- Augenlider, insbesondere Lidränder und Wimpernansatz nun mit getränktem Wattepad befeuchten und den Lidrand entlang der oberen und unteren Lidkante sanft massieren
- Vorhandene Krusten und Ablagerungen vorsichtig entfernen. Zur Behandlung der Lidränder empfiehlt es sich das untere Augenlid mit einem Finger der freien Hand sanft nach unten beziehungsweise das obere Augenlid sanft nach oben zu ziehen, damit der Lidrand gut erreicht werden kann. Bei Bedarf das gebrauchte durch ein frisches Wattepad ersetzen.

Verwerfen Sie die verwendeten Wattepads nach der Behandlung jedes Augenlids, nicht den gleichen Wattepad für beide Augenlider verwenden.

Similasan BlephaCura® nicht direkt in die Augen geben, nicht die Innenseite der Lider oder die Augenoberfläche mit dem getränkten Wattepad behandeln.

Gegenanzeigen und Überempfindlichkeitsreaktionen:

Similasan BlephaCura® sollte bei einer Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe nicht angewendet werden. Potentielle Überempfindlichkeitsreaktionen können in sehr seltenen Fällen in Form von temporären Reizungen auftreten. Die (Haut-)Reizungen (z.B. Rötung, Schwellungen) sind auf den Anwendungsbereich begrenzt und können beispielsweise von einer brennenden Empfindung oder Juckreiz begleitet sein. Sie treten akut auf, sind von leichter Ausprägung und klingen nach Meiden des Präparates rasch und folgenlos ab.

Hintergrundinformationen

Bei der Lidrandentzündung (Blepharitis) handelt es sich meist um eine chronische Erkrankung, deren Behandlung und Verlauf mit unerfreulichen Rückschlägen und Rezidiven verbunden sein kann und die daher einer sorgfältigen, täglichen Pflege bedarf. Bei Bedarf kann es hilfreich sein, vor der Behandlung mit Similasan BlephaCura® warme Umschläge (37–38 °C) für ca. 15 Minuten auf die geschlossenen Lider aufzulegen, damit evtl. bestehende Talgfröpfe und Sekrete an den Lidrändern verflüssigt und anschließend problemlos entfernt werden können.

Hinweise:

Bei Verletzungen, Infektionen und/oder nach chirurgischen Eingriffen am Auge oder Augenlid sollte vor Verwendung medizinischer Rat eingeholt werden.

Similasan BlephaCura ist auch für Kontaktlinsenträger geeignet. Es empfiehlt sich die Kontaktlinsen erst nach der Anwendung einzusetzen.

Inhalt der Packung, Aussehen und Geruch:

Similasan BlephaCura® ist aufgrund der liposomalen Formulierung eine opalescente Flüssigkeit mit milchigem Aussehen und dem charakteristischen, natürlichem Geruch nach Lecithin.

Haltbarkeit und Aufbewahrung

Kühl und trocken lagern.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Nach Anbruch 4 Wochen verwendbar.

Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr verwenden.



Similasan

Similasan BlephaCura®



Mode d'emploi

Similasan BlephaCura® suspension liposomale pour le soulagement des inflammations et le soin quotidien du bord des paupières

Composition

1 ml contient: Chlorure de sodium 8 mg, lécithine de soja 5 mg, phénolxyéthanol 5 mg, éthanol 4 mg, vitamine A-palmitate 0,125 mg, vitamine E 0,01 mg, aqua purificata

Indications

Similasan BlephaCura® permet de soulager les inflammations du bord palpébral dont il représente le traitement d'accompagnement et est indiqué pour les soins et l'hygiène quotidiens du bord palpébral. Similasan BlephaCura® entretient et facilite le processus de guérison naturel lors d'inflammations et d'irritations du bord des paupières.

Utilisation

Il est conseillé d'utiliser Similasan BlephaCura® deux fois par jour, matin et soir. Similasan BlephaCura® doit être appliquée au moyen de disques (en coton) adaptés aux soins des paupières et ne peluchant pas. Afin d'éviter les impuretés, l'embout de la suspension ne doit entrer en contact avec aucune surface et en particulier celle du disque de coton. Veuillez imbibir de près le disque de gouttes de Similasan BlephaCura®. Dans le cadre de l'utilisation de Similasan BlephaCura® dans un contexte de soins et d'hygiène quotidiens du bord palpébral, toutes les croûtes et tous les squames doivent être éliminées soigneusement. Il est conseillé de se laver les mains avant d'utiliser ce produit.

Conseils pour l'utilisation correcte:

- Imbibir un disque de coton de Similasan BlephaCura®
- Par la suite, humecter les paupières et en particulier le bord palpébral et la base des cils avec le disque de coton imbibée et masser délicatement le long du bord interne et externe de la paupière.
- Éliminer délicatement les croûtes et squames existants. Pour le traitement des bords des paupières, il est conseillé de tirer doucement vers le bas la paupière inférieure avec un doigt de la main libre ou bien la paupière supérieure vers le haut, afin que le bord palpébral soit plus facilement accessible. Renouveler le disque de coton si besoin.

Jeter le disque souillé après le traitement de chaque paupière, ne pas utiliser le même disque de coton pour les deux paupières.

Ne pas administrer Similasan BlephaCura® directement dans l'œil, ne pas traiter la partie interne des paupières ou la surface de l'œil avec le disque de coton imbibé.

Contre-indications et réactions d'hypersensibilité:

Similasan BlephaCura® ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité à l'un de ses composants. Dans des cas très rares, d'éventuelles réactions d'hypersensibilité peuvent survenir sous forme d'irritations temporaires. Les irritations (cutanées) (par ex. rougeurs, enflures) sont limitées à la zone d'utilisation et peuvent par exemple s'accompagner d'une sensation de brûlure ou de démangeaisons. Elles apparaissent de manière aiguë subitement, sont peu intenses et disparaissent rapidement et sans conséquences dès que le produit n'est plus utilisé.

Informations de base

L'inflammation du bord palpébral (blépharite) représente le plus souvent une maladie chronique dont le traitement et l'évolution peuvent s'accompagner d'aggravations et de récidives fâcheuses et qui nécessitent donc des soins quotidiens minutieux.

Quelquefois, avant le traitement par Similasan BlephaCura®, il peut s'avérer utile de poser des compresses chaudes (37–38 °C) sur les paupières fermées pendant environ 15 minutes afin de liquéfier les éventuels bouchons de sébum et les sécrétions des bords palpébraux et de pouvoir les enlever sans problèmes par la suite.

Précautions:

En cas de lésions, d'infection et/ou après une opération chirurgicale de l'œil ou de la paupière, consultez un médecin avant d'utiliser Similasan BlephaCura. Similasan BlephaCura convient également aux porteurs de lentilles de contact. Il est recommandé de l'utiliser avant de mettre les lentilles de contact.

Contenu de la boîte, aspect et odeur:

En raison de la formulation liposomale, Similasan BlephaCura® est un liquide opalescent d'aspect laiteux et dont l'odeur naturelle est caractéristique de la lécithine.



Stockage et conservation

Conserver au frais et au sec.

Conserver hors de portée des enfants.

Durée de conservation après ouverture: 4 semaines.

Ne plus utiliser au-delà de la date de péremption.

Dernière révision: 2021-05





Similasan

Similasan BlephaCura®

Istruzioni d'uso

Similasan BlephaCura® sospensione liposomiale per il lenimento delle infiammazioni e per la cura quotidiana del margine palpebrale

Composizione

1 ml contiene: Cloruro di sodio 8 mg, lecitina di soia 5 mg, fenossietanol 5 mg, etanolo 4 mg, vitamina A-palmitato 0,125 mg, vitamina E 0,01 mg, acqua purificata

Indicazioni

Similasan BlephaCura® è indicato per il lenimento e il trattamento concomitante delle infiammazioni, come pure per la cura e l'igiene quotidiana del margine palpebrale. Similasan BlephaCura® supporta e favorisce il processo di guarigione naturale in caso di infiammazioni e irritazioni dei margini palpebrali.

Uso

Si consiglia di utilizzare Similasan BlephaCura® due volte al giorno, la mattina e la sera. Similasan BlephaCura® deve essere applicato utilizzando dei dischetti (di cotone) non filacciosi adeguati per la cura delle palpebre. Per evitare contaminazioni, non toccare alcuna superficie – in particolare il dischetto di cotone – con il beccuccio. Far cadere alcune gocce di Similasan BlephaCura® sul dischetto di cotone da una breve distanza. Durante la cura e l'igiene quotidiana del margine palpebrale con Similasan BlephaCura® eliminare completamente croste e depositi. Si consiglia di applicare il prodotto dopo essersi lavati le mani.

Suggerimento per l'uso corretto:

- Bagnare un dischetto di cotone con Similasan BlephaCura®.
- Inumidire le palpebre, in particolare margini palpebrali e inserzione ciliare, con il dischetto di cotone bagnato e massaggiare delicatamente il margine palpebrale lungo il bordo superiore e inferiore.
- Eliminare croste e depositi presenti con cautela. Per il trattamento dei margini palpebrali, si consiglia di tirare delicatamente verso il basso il margine inferiore – o verso l'alto, se si tratta del margine superiore – con un dito della mano libera, in modo da poter raggiungere agevolmente il margine palpebrale. Se necessario, utilizzare un dischetto di cotone nuovo.

Gettare il dischetto di cotone utilizzato dopo ogni uso e non utilizzare lo stesso dischetto per entrambe le palpebre.

Non applicare Similasan BlephaCura® direttamente negli occhi, non trattare il lato interno delle palpebre o la superficie oculare con il dischetto di cotone inumidito.

Controindicazioni e reazioni di ipersensibilità:

Similasan BlephaCura® non deve essere utilizzato in caso di ipersensibilità verso un costituente del prodotto. Potenziali reazioni di ipersensibilità possono manifestarsi in casi molto rari sotto forma di irritazioni temporanee.

Le irritazioni (cutanee) (ad es. arrossamento, gonfiore) sono limitate all'area di applicazione e possono essere accompagnate, ad esempio, da sensazione di bruciore o prurito. Esse sono a comparsa acuta, di lieve entità e regrediscono rapidamente e senza conseguenze evitando l'uso del preparato.

Informazioni di base

L'inflammazione del margine palpebrale (blefarite) è generalmente una malattia cronica, il cui trattamento e decorso può essere connesso a spiacevoli ricadute e recidive e che quindi richiede scrupolose attenzioni quotidiane. In caso di necessità, prima del trattamento con Similasan BlephaCura® può essere utile applicare sulle palpebre chiuse impacchi caldi (37–38 °C) per circa 15 minuti, in modo da ammorbidente eventuali tappi sebacei e secrezioni sui margini palpebrali e poter quindi rimuoverli facilmente.

Avvertenze:

In caso di lesioni, infezioni e/o dopo interventi chirurgici sull'occhio o sulla palpebra, consultare il medico prima dell'uso. Similasan BlephaCura è adatto anche per i portatori di lenti a contatto. Si raccomanda di mettere le lenti a contatto solo dopo l'applicazione.

Contenuto della confezione, aspetto e odore:

A causa della formulazione liposomiale, Similasan BlephaCura® è un liquido opalescente di aspetto lattiginoso e dal caratteristico odore naturale di lecitina.

Durata e conservazione

Conservare in luogo fresco e asciutto. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Il contenuto può essere utilizzato per 4 settimane dopo l'apertura della confezione. Non utilizzare dopo la data di scadenza.



Similasan

Similasan BlephaCura®



Instructions for use

Similasan BlephaCura® liposomal suspension for the relief of inflammation of the eyelid margin and for daily care of the eyelid margin

Ingredients

1 ml contains: Sodium chloride 8 mg, soy lecithin 5 mg, phenoxyethanol 5 mg, ethanol 4 mg, vitamin A-palmitate 0,125 mg, vitamin E 0,01 mg, aqua purificata

Therapeutic indications

Similasan BlephaCura® serves to relieve and treat inflammation of the eyelid margin; it is also used in the daily care and hygiene of the eyelid margin. Similasan BlephaCura® supports and promotes the natural healing process with inflammation and irritation of the eyelid margins.

Areas of application

It is recommended that Similasan BlephaCura® should be used twice daily – in the morning and evening. Similasan BlephaCura® should be applied with fluff-free (cotton) pads that are suitable for eyelid care. To avoid contamination, the dropper should not come into contact with any surfaces, especially not the cotton pad. Please drop Similasan BlephaCura® onto the cotton pad from a small distance. During daily care and hygiene of the eyelid margin with Similasan BlephaCura®, all crusts and deposits should be thoroughly removed. It is recommended that you wash your hands before application.

Tips for correct use:

- Moisten a cotton pad with Similasan BlephaCura®.
- Then moisten the eyelids, especially the eyelid margins and the base of the eyelashes with a saturated cotton pad and gently massage the eyelid margin along the upper and lower edge of the eyelid.
- Carefully remove any crusts and deposits that are present. To treat the eyelid margins, it is recommended that the lower eyelid should be gently pulled downward with one finger of the free hand or the upper eyelid should be gently pulled upward, so that the eyelid margin can be easily reached. If necessary, replace the used cotton pad with a new one.

Discard the cotton pad used after treating each eyelid; do not use the same cotton pad for both eyelids.

Do not place Similasan BlephaCura® directly into the eyes. Do not treat the inside of the eyelids or the eye surface with the saturated cotton pad.

Contraindications and hypersensitivity reactions:

Similasan BlephaCura® should not be used in the presence of hypersensitivity to any of the ingredients. Potential hypersensitivity reactions may appear, in very rare cases, in the form of a temporary irritation. The (skin) irritation (e.g. reddening, swelling) is confined to the application area and may be accompanied by a burning sensation or by itching, for example. It appears acutely, is mild in form and subsides rapidly and with no lasting effect following avoidance of the preparation.

Background information

An inflammation of the eyelid margin (blepharitis) is usually a chronic disease, the treatment and course of which can be associated with disappointing setbacks and recurrence, therefore it requires a careful daily routine. It might be helpful to place warm compresses (37–38 °C) on the closed eyelids for about 15 minutes before treating with Similasan BlephaCura®. This facilitates the liquefaction of any existing mucous clots and secretions from the sebaceous glands and their subsequent problem-free removal.

Notes:

In the event of injury, infection and/or after eye or eyelid surgery, medical advice should be sought before using the product. Similasan BlephaCura is also suitable for contact lens wearers. It is recommended that contact lenses be inserted after the product has been used.

Packaging contents, appearance and fragrance:

Due to its liposomal formulation, Similasan BlephaCura® is an opalescent liquid with a milky appearance and the characteristic natural fragrance of lecithin.

Shelf-life and storage

Store in a cool, dry place. Keep out of reach of children. After opening the contents can be used for 4 weeks.

Do not use after expiry date.

Date of last revision: 2021-05



Aggiornamento informazioni: 2021-05

Symbol/Symbole/Simbolo/Symbol:

| | | | | |
|--|---|---|---|--------------------------------------|
| | Hersteller | Fabriqué par | Produkt von | Manufacturer |
| | Verfalldatum (JJJJ-MM: Jahr-Monat) | Date de péremption (AAAA-MM: Année-Mois) | Data di scadenza (AAAA-MM: anno-mese) | Expiry date (YYYY-MM: Year-Month) |
| | LOT-Nummer | Numéro de lot | Lotto numero | LOT-number |
| | Lagertemperatur 2 °C–25 °C | Température de stockage 2 °C–25 °C | Temperatura di conservazione 2 °C–25 °C | Storage temperature 2 °C–25 °C |
| | Gebrauchsinformation beachten! | Observer la notice explicative | Leggere attentamente il foglio illustrativo | Observe instruction leaflet! |
| | Nicht verwenden wenn die Flasche beschädigt ist | Ne pas utiliser si le flacon est endommagé | Non usare se la bottiglia è danneggiato | Do not use if the bottle is damaged |
| | Medizinprodukt | Dispositif médical | Dispositivo medico | Medical device |

Produkt von

Data di scadenza
(AAAA-MM: anno-mese)

Lotto numero

Temperatura di conservazione 2 °C–25 °C

Leggere attentamente il foglio illustrativo

Non usare se la bottiglia è danneggiato

Dispositivo medico

Expiry date

(YYYY-MM: Year-Month)

LOT-number

Storage temperature 2 °C–25 °C

Observe instruction leaflet!

Do not use if the bottle is damaged

Medical device